Приложение №28

**Тарифы по I этапу диспансеризации определенных групп взрослого населения по стоимости услуг на 2018 год**

| пол | Опрос (анкетирование), в целях выявления жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза,курения,потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности, а также в целях выявления у граждан в возрасте 75 лет и старше риска падений, жалоб. характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и зрения | Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела | Измерение артериального давления | Определение уровня общего холестерина в крови (экспресс-методом) | Определение уровня глюкозы в крови натощак (экспресс-методом) | Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска | Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарным диабетом второго типа и хронических болезней почек | Электрокардиография (в покое) | Осмотр фельдшером (акушеркой), взятие с использование щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование (для женщин) | Флюорография легких | Маммография обеих молочных желез (для женщин) | Индивидуальное профилактическое консультирование в отделении (кабинете) медицинской профилактики для граждан в возрасте до 72 лет с высокой относительным и высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском,и (или)ожирением,и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более и (или) курящих более 20 сигарет в день; направление указанных граждан на углубленное ( индивидуальное или групповое)профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации | Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови | Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | Измерение внутриглазного давления | Прием (осмотр) врачом-терапевтом,по завершению исследований первого этапа диспансеризации,проводимых с периодичностью 1 раз в 3 года,включающий установление диагноза,определение группы здоровья, группы диспансерного наблюдения,проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию,уровню физической активности,отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя,определениия медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации | Прием (осмотр) врачом-терапевтом,по завершению исследований первого этапа диспансеризации,проводимых с периодичностью 1 раз в 2 года при наличии выявленных патологических изменений,включающий определение в соответствии с выявленными изменениями медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| м | 19,05 | 21,44 | 11,91 | 116,72 | 60,74 | 75,03 | 75,03 | 209,62 | - | 104,81 | - | 202,61 | 146,22 | 151,26 | 35,73 | 303,71 | 303,71 |
| ж | 19,05 | 21,44 | 11,91 | 116,72 | 60,74 | 75,03 | 75,03 | 209,62 | 91,71 | 104,81 | 373,97 | 202,61 | 146,22 | 151,26 | 35,73 | 303,71 | 303,71 |